ORALDINE®
Hexetidina

COMPOSICION

Cada 100 ml de solución contienen

Hexetidina ---0,1 g.

Sacarina sódica; Etanol (5,1% v/v), Polisorbato 60, Salicilato de metilo, Aceite de clavo, Mentol, Aceite de pipermint, Eucaliptol, Azorrubina (E-122), Acido cítrico, Aceite de anís y Agua purificada, c.s.

INDICACIONES

Alivio sintomático de afecciones de la cavidad bucal (encías, paladar) que cursen con componente infeccioso, p.e., gingivitis, estomatitis, periodontitis, aftas. Halitosis. Alivio sintomático de las afecciones faríngeas, p.e.: faringitis, glositis.

MODO DE EMPLEO Y POSOLOGIA

Adultos y niños mayores de 6 años: después de cepillarse los dientes y haber utilizado la seda dental, aclarar completamente la pasta de dientes antes de utilizar este colutorio. Para conseguir una adecuada actuación del producto, es suficiente efectuar lavados bucales o gargarizar con una cucharada sopera de Oraldine puro durante 30 seg. También puede aplicarse tópicamente sobre la zona afectada mediante una torunda de algodón durante algunos minutos. Repítase 2-3 veces al día o más si lo considera necesario.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formula.

PRECAUCIONES

Si los síntomas persisten más de 5 días, o se agravan, o aparece fiebre u otros síntomas, consultar al médico. Este medicamento contiene Azorrubina (E-122) como excipiente. Puede causar reacciones de tipo alérgico, incluído asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico. Las aplicaciones frecuentes pueden producir irritación y sequedad de mucosas.

EFECTOS SECUNDARIOS

Aunque no se han descrito podría producir reacciones de hipersensibilidad.

INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO

Es muy improbable dada su escasa toxicidad y su uso tópico. En caso de sobredosis o ingestión accidental de grandes cantidades, acudir a un centro médico indicando el producto y la cantidad ingerida, o consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACION

Envases de 30 ml, 200 ml y 400 ml de solución bucofaríngea.

TITULAR

WARNER LAMBERT CONSUMER HEALTHCARE, S. Com.p.A.
Polígono Industrial Mas Mateu, s/n.
El Prat de Llobregat, BARCELONA

FABRICANTE
PARKE DAVIS
5 Avenue de Concyr
45071 ORLEANS CEDEX 2 (Francia)

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.